

TOXOCARA CANIS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Unas de las **lombrices parasitarias** más frecuentes en los perros son las que reciben el nombre de *Toxocara canis*. Hablamos también de unos parásitos que pueden afectar a los seres humanos y viceversa, lo que recibe el nombre de zoonosis, de ahí la importancia de seguir siempre un adecuado calendario de desparasitaciones.



Índice:

1. ¿Qué es *Toxocara canis*?
2. ¿Cuáles son los síntomas de *Toxocara canis*?
3. Tratamiento contra *Toxocara canis*
4. ¿*Toxocara canis* en humanos?

1. ¿Qué es *Toxocara canis*?:

La *Toxocara canis* es una **lombriz parasitaria** que se localiza en el estómago y los intestinos del perro, donde puede alcanzar una longitud considerable de casi **20 centímetros**. Las hembras ponen una gran cantidad de huevos sumamente resistentes en el ambiente, donde incluso perviven durante años.

Los perros pueden infectarse en el período prenatal, durante el *embarazo de la perra*, pero también a través de la leche materna, al tragar huevos puestos en el ambiente o al ingerir alguna presa infestada.

El ciclo biológico de este parásito comienza cuando **los huevos llegan al estómago**. A través de la circulación sanguínea, las larvas se desplazan hasta los pulmones y, desde ellos, alcanzan la tráquea y vuelven a ser ingeridas. De vuelta al estómago estas larvas se transforman en lombrices adultas listas para poner huevos que, ya en el suelo, son capaces de **infectar a otros animales**, reiniciando así el ciclo.

2. ¿Cuáles son los síntomas de *Toxocara canis*?:

Según los perros van creciendo, desarrollan **cierta resistencia** a *Toxocara canis*, lo que impide que muchos de estos parásitos consigan completar su ciclo biológico. A cambio, algunas de estas larvas **se enquistan** en diferentes partes del cuerpo, activándose, en el caso de las perras, cuando se encuentran en período de gestación, momento en el que migran a placenta y glándulas mamarias.

Así, *Toxocara canis* no suele provocar ningún síntoma en los perros adultos. En los cachorros podríamos ver **vómitos y diarrea** intermitentes, con **expulsión de lombrices** con aspecto de espaguetis. La observación directa de los parásitos es un método de diagnóstico directo.

Tomar una muestra de heces para examinar al microscopio permite la identificación de los huevos. Los cachorros con graves infestaciones no crecen, están pálidos, con el **abdomen hinchado con dolor** a la palpación y anemia.

Las larvas en los pulmones pueden provocar accesos de **tos y náuseas**.



Imagen: <http://www2.projects.science.uu.nl>

3. Tratamiento contra *Toxocara canis*:

El tratamiento debe ser **prescrito por el veterinario**, ya que es este profesional el que debe identificar el parásito. Hay varios fármacos contra *Toxocara canis* y el veterinario escogerá el más adecuado en función de las características de nuestro perro. Es importante buscar un producto que consiga **eliminar también las larvas** enquistadas, como milbemax.

La mejor forma de combatir los parásitos internos es la prevención, esto es, el establecimiento de un correcto *calendario de desparasitaciones* que comenzará a los quince días de vida se repetirá cada dos semanas hasta finalizar la vacunación y se mantendrá cada 3-4 meses durante toda la vida del perro.

Se recomienda *desparasitar a las perras gestantes* en las dos semanas anteriores a la fecha aproximada de parto y durante la lactancia porque de esta forma disminuye la carga parasitaria del ambiente y **se reduce la infestación de los cachorros**.

4. ¿Toxocara canis en humanos?:

Toxocara canis puede afectar a los seres humanos, provocando una enfermedad llamada **larva migrans visceral**. El contagio en las personas se debe a la ingesta de huevos, por lo que los niños más pequeños, que comen tierra y presentan hábitos de higiene deficitarios, son los que tienen más probabilidades de infestación.

Los espacios que comparten perros y niños, como los **parques**, pueden convertirse en focos de contaminación. En este sentido es imprescindible recoger siempre los excrementos caninos.

El ciclo biológico de *Toxocara canis* en el humano es diferente que en el perro porque las larvas no pueden llegar a adultas. Al contrario, atraviesan la pared intestinal y **migran al hígado, los pulmones y la piel**. En grandes infestaciones se producen síntomas como dolor abdominal, tos, picor o erupción cutánea y las larvas pueden extenderse al corazón, los riñones, el bazo, el cerebro o los ojos.

La prevención en humanos pasa por mantener a los animales correctamente desparasitados, sobre todo cachorros y perras preñadas, y educar a los niños en los **hábitos básicos de higiene**.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar*