


MALASSEZIA EN GATOS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



La dermatitis por malassezia ocurre de forma secundaria a algún proceso patológico, inmunosupresor, que cause **alteraciones en la piel** o por ciertas condiciones ambientales. De forma natural, en la piel y conductos auditivos de nuestros gatos encontramos esta levadura como flora comensal a la vez que impide la proliferación de hongos patógenos. Cuando bajo un proceso predisponente la levadura malassezia prolifera de más, aparecerán lesiones en nuestros gatos, generalmente de olor rancio, con costras, seborrea, alopecia, enrojecimiento, picor y autotraumatismos; también puede afectar al canal auditivo provocando otitis. El diagnóstico se realiza por visualización directa de varias levaduras por campo en el microscopio y el tratamiento busca la eliminación de dicho sobrecrecimiento con antifúngicos y el control de la causa que lo origina.

Índice:

1. ¿Qué es la dermatitis por malassezia en gatos?
2. Síntomas de malassezia en gatos
3. Diagnóstico de la dermatitis por malassezia en gatos
4. Tratamiento de la infección por malassezia en los gatos

1. ¿Qué es la dermatitis por malassezia en gatos?:

Se trata de una dermatitis pruriginosa causada por la **levadura *Malassezia pachydermatis***, localizada en el estrato cutáneo córneo de los gatos. Dicha levadura es comensal habitual de la piel de nuestros gatos, cuya presencia impide el desarrollo de otros hongos patógenos.

Se trata de una **infección** que puede localizarse en la cara, oídos, ingles, axilas, extremidades, zona interdigital y parte ventral del cuello.

¿Qué causa el sobrecrecimiento de malassezia en gatos?:

El desarrollo de este problema dermatológico se produce cuando la levadura **malassezia prolifera**. En condiciones normales, este sobrecrecimiento queda inhibido debido a una serie de factores, como son:

- Propiedades fungostáticas de la película hidrolipídica cutánea.
- Inmunidad local con IgA de las glándulas apocrinas.
- Inmunidad celular.
- Descamación diaria de la piel.

Dicho equilibrio se puede alterar por ciertas condiciones, como el calor, la humedad y una bajada de defensas del gato. En relación a esto último, el sobrecrecimiento de malassezia en gatos se ha visto relacionado con infecciones como *leucemia felina*, *inmunodeficiencia felina* y *herpesvirus felino*; y por timomas, síndromes paraneoplásicos y diabetes. Esto indica que **puede estar relacionada con enfermedades subyacentes inmunosupresoras**, especialmente en razas como sphinx y devon rex. También pueden causarla fármacos inmunosupresores como los corticoides.

Los gatos con picor como en los casos de dermatitis atópica también presentan un riesgo superior de sobrecrecimiento de malassezia, al igual que

los que lo presentan por parásitos externos como pulgas o ácaros en los oídos o cualquier enfermedad dermatológica que cause picor.

2. Síntomas de malassezia en gatos:

Malassezia pachydermatis causa **inflamación** debido a la liberación de metabolitos de enzimas como las lipasas que alteran la lámina hidrolipídica de la piel, a la vez que presenta antígenos de superficie que generan reacción inmunitaria. Además, también produce una proenzima llamada zimógeno que activa el complemento, que es un componente del sistema inmune. El **picor** se produce por sustancias proteolíticas liberadas por el organismo ante dicho proceso.

Los signos clínicos de malassezia en gatos incluyen:

- **Acné felino.**
- **Otitis externa ceruminosa con picor.**
- **Dermatitis exfoliativa.**
- **Alopecia.**
- **Eritema.**
- **Seborrea seca o aceitosa.**
- **Autotraumatismos.**
- **Paroniquia.**
- **Costras.**
- **Hiperqueratosis e hiperpigmentación.**
- **Liquinificación.**
- **Lesiones con olor a rancio.**



3. Diagnóstico de la dermatitis por malassezia en gatos:

El **diagnóstico diferencial** de un gato con algunos de los signos clínicos antes descritos indicativos de dermatitis por malassezia incluye las siguientes patologías:

- Reacción adversa al alimento.
- **Alergia a la picadura de pulga.**
- Demodicosis.
- **Sarna.**
- Pioderma superficial.
- Dermatitis atópica.
- Defectos de queratinización.

Además, hay que tener en cuenta que muchos de ellos pueden ser la causa que la origine.

El diagnóstico de malassezia en los gatos se realiza, además de por la sintomatología del gato, mediante **citología con cinta adhesiva** de una muestra de lesión sospechosa o mediante un frotis de impresión. Posteriormente, se observa al microscopio, donde se visualiza la levadura con forma alargada y oval "en forma de zapato" con un orificio que es unipolar. Si se observan hasta 2 levaduras en campo, se considera normal. Una prueba positiva es cuando se observan en una muestra de piel **más de 4 o 5 levaduras** por campo y más de 10 si es una muestra de conducto auditivo.

4. Tratamiento de la infección por malassezia en los gatos:

El tratamiento de la infección por malassezia en gatos se basa en el **uso de antifúngicos**, en concreto:

- Ketoconazol sistémico a dosis de 10 mg/kg cada 24 horas durante 3 semanas.
- **Itraconazol** oral a dosis de 5 mg/kg cada 24 horas durante 3 semanas.
- Champú con ketoconazol o miconazol y clorhexidina al 2 % dos veces a la semana.
- Cremas tópicas con algún imidazol para lesiones focalizadas leves.

En algunos casos, esto solo es suficiente para acabar con el sobrecrecimiento y la remisión de las lesiones. Sin embargo, en otros casos se necesitará ir más allá y detectar las enfermedades subyacentes que están causando dicho sobrecrecimiento, tratándolas específicamente y controlando la dermatitis por malassezia en gatos con **champús**.



En el caso de otitis por malassezia, se deben usar antifúngicos como el miconazol, la nistatina o el clotrimazol, combinados con antibióticos y corticoides para las infecciones secundarias y el picor, sucesivamente.

En ninguno de los casos se debe automedicar al gato, puesto que debe ser un profesional quien diagnostique la proliferación de la levadura y determine el mejor tratamiento.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía

- R. G. Harvey, P. J. McKeever. (2001). Manual ilustrado de enfermedades de la piel en perro y gato. Grass edicions.
- ESCCAP. Control de las micosis superficiales en perros y gatos. Disponible en: http://www.esccap.es/wp-content/uploads/2019/04/guia2_2019.pdf
- Vets & clinics by Advance. Dermatitis por Malassezia. Disponible en: <https://www.affinity-petcare.com/veterinary/patologias/dermatitis-por-malassezia>

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Laura García Ortiz, Veterinaria especializada en medicina felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*