

CÓLERA AVIAR - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



El cólera aviar es una enfermedad bacteriana relativamente común entre las **aves de corral**. Es una alteración que se manifiesta con mayor o menor gravedad, siendo, en este último caso, **potencialmente mortal**. Resulta muy contagiosa y puede causar una auténtica epidemia si tenemos varias aves en convivencia, ya que además es resistente a numerosos antibióticos.

Índice:

1. ¿Qué es el cólera aviar?
2. Síntomas del cólera aviar
3. Tratamiento del cólera aviar
4. Prevención del cólera aviar

1. ¿Qué es el cólera aviar?:

Esta enfermedad es de **origen bacteriano**. En concreto, está causada por la bacteria *Pasteurella multocida*. Pueden desencadenar la enfermedad diferentes serotipos y con distintos grados de virulencia. Además, es una **bacteria muy resistente** en el ambiente. Algunas gallinas enfermas de coriza infecciosa agravan su cuadro al sufrir también cólera aviar. Las aves pueden tener esta bacteria como parte de la flora normal del aparato respiratorio, por eso es considerado un patógeno secundario en otras enfermedades, aunque puede ser ella misma el desencadenante primario.

Además de las aves de corral, también pueden padecer cólera aviar **las aves silvestres**. La bacteria puede encontrarse en otros animales, ser humano incluido. Las aves se contagian al ingerir la bacteria que ha contaminado el agua o la comida. Las deposiciones de aves enfermas o portadoras que manchen los lugares comunes son otra fuente de infección. Además, otra vía es la respiratoria, por inhalación o estornudos, y la cutánea, a través de heridas y distintas lesiones.



2. Síntomas del cólera aviar:

La gravedad del cuadro va a verse influida por la virulencia de la cepa. Además, hay que tener en cuenta la especie afectada, el estado de salud del ejemplar enfermo, el ambiente en el que viva, su manejo, etc. En función de la presentación, se habla de **infección sobreaguda, aguda o crónica**. La sobreaguda se caracteriza por la muerte repentina de las aves afectadas, sin que hayamos detectado ningún síntoma de enfermedad.

a) Síntomas del cólera aviar agudo:


En la aguda apreciaremos signos como los siguientes:

- Inapetencia, la gallina no come.
- Fiebre.
- Sed.
- Somnolencia.
- Postración, el ave permanece inmóvil.
- Diarrea abundante que puede contener sangre.
- Problemas respiratorios.
- Mucosidad.
- Las crestas y las barbillas adquieren una coloración morada porque el ave no consigue hacerse con el oxígeno suficiente.
- Hemorragias generalizadas.

b) Síntomas del cólera aviar crónico:

En la presentación crónica del cólera aviar, encontramos una sintomatología como la siguiente:

- Barbillas hinchadas por un pus que puede rezumar.
- Artritis.
- Masas o abscesos.
- Hemorragias.
- Agrandamiento del hígado y del corazón.
- Otras lesiones internas.



3. Tratamiento del cólera aviar:

Al tratarse de una enfermedad bacteriana, el veterinario, y solo él, puede pautarnos la **administración de antibióticos**, aunque no siempre se consiguen buenos resultados, debido a que algunas cepas son muy resistentes. Por ello, numerosos antibióticos de uso habitual no logran eliminar esta bacteria. Para acertar con el antibiótico, lo ideal sería hacer un **antibiograma**. Esta prueba permite determinar a qué antibióticos son sensibles o resistentes las bacterias presentes en el ave.

Además, es básico un buen manejo. La **alimentación adecuada y la higiene** son pilares fundamentales tanto para la recuperación como para la prevención. En general, por la mejora en las condiciones de vida de las aves, es más probable que nos encontremos con casos crónicos que agudos.

4. Prevención del cólera aviar:

Podemos proteger a nuestras gallinas gracias a la **vacunación** y proporcionándoles siempre unas condiciones de vida adecuadas. La vacuna puede administrarse ya durante los primeros meses de vida. Será el veterinario quien nos indique la pauta más adecuada para inocular esta y otras vacunas, así como el protocolo en el caso de tener que repetir las dosis, ya que **hay varios tipos de vacunas**.

Para una protección más completa, puede ser necesario poner dos dosis separadas por 3-4 semanas. La aplicación, en función de la vacuna, es **subcutánea, intramuscular u oral**. Eso sí, debemos tener en cuenta que, al haber varias cepas, la vacuna puede no proteger contra todas ellas. Esto quiere decir que el ave vacunada podría contraer cólera aviar.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía

- Huberman, Yosef Daniel y Terzolo, Horacio Raúl. 2016. Cólera aviar en aves de corral. Portal Veterinaria.
- Ottinger, Doug. 2019. The Risks of Keeping Goats with Chickens. Backyard Poultry.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*