

PARAINFLUENZA CANINA - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Quién tiene un perro tiene un amigo incondicional y es por esto que nuestra mascota se merece lo mejor y nosotros como propietarios debemos procurarle un continuo y completo estado de bienestar, pero lamentablemente esto no solo pasa por brindarle una alimentación adecuada, llevarlo periódicamente al veterinario y mimarle, ya que nuestro perro siempre será susceptible a padecer múltiples enfermedades.

Por este motivo es importante que nos mantengamos informados acerca de qué enfermedades pueden afectar a nuestro can y a través de qué síntomas pueden manifestarse, ya que de este modo podremos actuar rápida y adecuadamente, lo que será vital para su recuperación.

Índice:

1. ¿Qué es la parainfluenza canina?
2. Síntomas de la parainfluenza canina
3. ¿Qué hacer si creo que mi perro padece parainfluenza canina?
4. Tratamiento de la parainfluenza canina
5. Prevención de la parainfluenza canina

1. ¿Qué es la parainfluenza canina?:

La parainfluenza canina es un virus que pertenece a la familia *Paramyxoviridae*, y junto con otros grupos de patógenos es responsable de **la traqueobronquitis infecciosa canina**, que popularmente se conoce como *tos de las perreras*.

Este virus **se transmite por vía aérea** de un perro a otro (por lo que es común encontrarlo cuando varios perros conviven, de ahí el nombre de tos de las perreras), esta transmisión se da a través de pequeñas gotas que segregan los perros a través de su nariz y/o boca.

El virus parainfluenza canina se fija y se replica en las células que recubren la tráquea, los bronquios y bronquiolos, la mucosa nasal y los ganglios linfáticos, causando principalmente un cuadro clínico a nivel respiratorio.



2. Síntomas de la parainfluenza canina:

Debemos mencionar que la parainfluenza canina tiene un periodo de incubación que oscila entre los 4 y 7 días, durante este periodo el perro no manifestará ningún síntoma.

Cuando el virus ya se está replicando, el síntoma más evidente a través del cual se manifiesta la parainfluenza canina es una **tos seca severa que finaliza con arcadas**, no obstante, dependiendo de cada caso en concreto también pueden darse los siguientes síntomas:

- Descarga nasal y ocular
- *Fiebre*
- Letargia
- Pérdida de apetito
- Bronconeumonía
- Tos
- Vómitos
- Expulsión de flemas

3. ¿Qué hacer si creo que mi perro padece prainfluenza canina?:

Si observamos en nuestro perro algunos de los síntomas que hemos mencionado anteriormente **debemos acudir urgentemente al veterinario** para determinar la causa.

La prainfluenza canina se diagnostica tomando una muestra de la mucosa nasal o bucal con la finalidad de poder aislar e identificar el virus o agente patógeno que está causando los síntomas, también se puede realizar un análisis de sangre para comprobar si existe un aumento en la sangre de determinados anticuerpos.



4. Tratamiento de la parainfluenza canina:

El tratamiento de la parainfluenza canina suele ser sintomático, ya que en un periodo aproximado de 10 días el perro ya habrá generado los suficientes anticuerpos y **habrá vencido a la enfermedad**, que debemos aclarar que es benigna.

Como tratamiento sintomático pueden darse fármacos antipiréticos (para disminuir la fiebre) y expectorantes para aliviar la acumulación de mucosidad en las vías respiratorias.

No obstante, la lesión que produce parainfluenza canina en las mucosas respiratorias es aprovechada por múltiples bacterias para colonizar estas áreas y crecer, por lo tanto, es habitual que el veterinario decida iniciar un *tratamiento con antibióticos* para prevenir cualquier complicación.



5. Prevención de la parainfluenza canina:

La vacuna contra parainfluenza canina está incluida en el *programa de vacunación para perros*, por lo tanto, basta con seguir adecuadamente el calendario de vacunas para prevenir esta enfermedad.

Además de tomar esta importante medida, si nuestro perro va a estar de forma continua confinado con otros perros, por ejemplo, en el caso de que lo vayamos a dejar en una residencia canina, entonces **debe ser vacunado específicamente contra la tos de las perreras**.

Esta vacuna puede aplicarse por vía nasal o intraparenteral, y en el caso de ser la primera vacunación se requerirán varias dosis.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía



- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*