


BOLAS DE PELO EN EL ESTÓMAGO DEL CONEJO



Al igual que los gatos, los conejos se lamen el pelo para acicalarse el manto. Esta rutina, de no ser complementada con alimentos que ayuden a la evacuación, puede convertirse en un hábito muy peligroso para nuestro conejo ya que ello conlleva la aparición de bolas de pelo.

Estas bolas de pelo llamadas tricobezoares son muy peligrosas para los conejos. De hecho, es uno de los problemas más graves que pueden ocurrirle y que afectan gravemente a su salud intestinal.

Índice:

1. Cómo prevenir las bolas de pelo en el conejo
2. Síntomas de la presencia de bolas de pelo en el conejo
3. El uso de la malta para conejos
4. Causas de caídas de pelo anormales

1. Cómo prevenir las bolas de pelo en el conejo:

* *El cepillado*

El cepillado diario con una carda metálica o con un cepillo muy espeso de crin de caballo, es la mejor forma de prevenir los tricobezoares.

Hay que ser especialmente cuidadoso durante **los periodos de muda**, ya que los conejos pierden mucho pelo muerto durante dichos periodos.

El ciclo de muda viene determinado, al margen de la temperatura, por las horas de exposición solar en los animales salvajes. Los conejos y otras mascotas domésticas no perciben ambos factores. Por consiguiente, dilatan la muda durante todo el año.



* *La alimentación*

El conejo **debe consumir cada día heno**. Ya que su gran aporte en fibra redonda en beneficio de su tránsito intestinal regular.

También la **alfalfa**, si el conejo no tiene problemas de sobrepeso, será un vegetal muy conveniente para regular el tránsito intestinal del logomorfo. La **piña natural** en trocitos (1 o 2 veces por semana), también es idónea para evacuar las bolas de pelo estomacales.



2. Síntomas de la presencia de bolas de pelo en el conejo:

Si sospechas que tu conejo sufre la presencia de bolas de pelo o tricobezoares en su estómago, toma nota de los siguientes síntomas:

- Panza hinchada
- No defecará durante días
- Se negará a comer
- Sus heces saldrán con pelos adheridos

Ante estos síntomas debes ir con tu conejo al veterinario, ya que esta dolencia se agrava más rápido que entre los gatos.



3. El uso de la malta para conejos:

Si el conejo tiene más de 3 meses, le podemos suministrar **malta para conejos**.

Si no le gusta comerla, cosa que sucede con bastante frecuencia, deberá untarse una pata con malta para conejos. El conejo lamerá dicha pata para eliminar la materia pegajosa, con lo cual de manera indirecta estará comiendo la beneficiosa malta para conejos. Una ayuda muy conveniente para soslayar las tricobezoares.

4. Causas de caídas de pelo anormales:

Nuestros conejos pueden sufrir pérdidas de pelo anómalas causadas por enfermedades dermatológicas, estrés y déficits alimentarios.

La **visita regular al veterinario** será una buena forma de detectar cualquier patología que incida en su salud y perjudique su manto. Existen snacks específicos para lagomorfos que aportan mucha fibra al conejo.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Ricard Sabatés Quivira

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*



- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*