

TULAREMIA EN CONEJOS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Aunque la tularemia es una enfermedad presente en **Asia, Europa y América del Norte**, por suerte no es muy común y si nuestro conejo permanece en el interior del hogar va a ser difícil que la contraiga. Aun así, en este artículo de ExpertoAnimal hablaremos de la **tularemia en conejos**, cómo se produce, cuáles son sus síntomas y cómo podemos tratarla y prevenirla. De esta manera evitaremos que nuestro conejo contraiga una patología que puede resultar mortal y que, además, es una zoonosis, es decir, una **enfermedad transmisible a los humanos**.

Índice:

1. ¿Qué es la tularemia?
2. ¿Cómo se contagia la tularemia en conejos?
3. Síntomas de la tularemia en conejos
4. Tratamiento de la tularemia en conejos
5. ¿Cómo prevenir la tularemia en conejos?

1. ¿Qué es la tularemia?:

Se trata de una **enfermedad bacteriana** provocada por la *Francisella tularensis*. Puede afectar a lagomorfos y roedores, que van a actuar como reservorio, y ha ganado, gatos, perros o seres humanos. Además, puede transmitirse de manera directa al entrar en contacto con animales o ambientes contaminados o mediante la intervención de un vector, es decir, un animal intermediario que puede ser una garrapata, un mosquito o tábanos.

La bacteria es muy **resistente en el ambiente**, aguantando incluso temperaturas bajo cero y limpiezas con lejía. Puede vivir semanas o meses. En cambio, muestra sensibilidad a desinfectantes comunes y a la luz del sol. La principal característica de la tularemia en conejos es que estos pueden permanecer asintomáticos y **morir de manera repentina**.

2. ¿Cómo se contagia la tularemia en conejos?:

Los conejos pueden contraer la tularemia al **entrar en contacto con ambientes contaminados**, ya que la bacteria puede encontrarse en el suelo, en vegetación o en el agua. También puede producirse el contagio si ingieren alimentos o agua infectada. Pero, además, la tularemia en conejos puede contraerse **por inhalación** y, muy importante, **por la picadura de vectores**.

Un conejo que tengamos dentro de casa va a ser difícil que pueda enfermar, pero no por ello debemos descuidar su protección. La tularemia puede afectar a los seres humanos, que se van a contagiar, básicamente, de la misma manera que los conejos, es decir, por picaduras, mordeduras, contacto con objetos contaminados que produzcan rozaduras o cortes. La bacteria también puede ingresar al organismo **por vía conjuntival, respiratoria o digestiva**, provocando una sintomatología diferente.



3. Síntomas de la tularemia en conejos:

La tularemia en conejos **puede pasar asintomática** y producir un cuadro de infección generalizada que llega a causar la **muerte súbita del animal**. En los casos más leves podremos observar síntomas como fiebre, debilidad generalizada, úlceras o abscesos. Además, el comportamiento del conejo puede cambiar. Los enfermos tienden a agruparse y presentan una capa de pelo áspero, con mal aspecto.

En los seres humanos suele producir escalofríos, dolores en músculos y articulaciones, cefaleas, vómitos, etc. Así mismo, dependiendo del punto de entrada se manifestarán **síntomas específicos**. Por ejemplo, en el caso de picaduras de vectores, puede haber **úlceras y necrosis** en el punto de inoculación e inflamación del ganglio más cercano. Si la entrada es por vía respiratoria se produce **neumonía**. Por vía digestiva, **gastroenteritis**. Los individuos que superan la tularemia mantienen inmunidad durante años, aunque, pasado un tiempo, podría producirse una nueva infección.

4. Tratamiento de la tularemia en conejos:

La tularemia en conejos, como enfermedad bacteriana que es, **se combate con antibióticos** que debe recetar el veterinario una vez confirmado el diagnóstico. De momento, **no existe vacuna** para la tularemia. Dado que se

trata de una patología potencialmente mortal, la prevención resulta nuestra mejor arma. En el siguiente apartado detallaremos las medidas preventivas.

5. ¿Cómo prevenir la tularemia en conejos?:

Para **evitar la tularemia en conejos**, pero, también, en seres humanos, conviene observar las siguientes pautas:

- Evitar el contacto con animales que desconozcamos y tengan mal aspecto.
- Mantener a los conejos en el interior.
- **Lavarse bien las manos.**
- No beber aguas de las que se desconozca la procedencia.
- **Lavar bien frutas y verduras.**
- Cocinar adecuadamente las carnes.
- **Desparasitar** o emplear repelentes para evitar la transmisión por vectores.
- **Utilizar guantes** si debemos manipular cadáveres o animales aparentemente enfermos.
- Como siempre, acudir al veterinario o médico ante cualquier síntoma sospechoso.





Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*