


MI PERRO ANDA COMO SI ESTUVIERA BORRACHO - CAUSAS Y QUÉ HACER



Cuando un perro comienza a caminar de forma anormal, como si estuviera realmente borracho, más que divertido debe ser un motivo de alerta y preocupación por parte del cuidador. A esto **se le denomina ataxia** y puede estar producido por diversas causas, desde simples desequilibrios en nutrientes y electrolitos o intoxicaciones hasta tumores o problemas en la médula espinal, cerebelo o aparato vestibular, que son los centros importantes en la coordinación y control de los movimientos. El diagnóstico debe ser exhaustivo, con una buena historia clínica, examen neurológico, analíticas y diagnóstico por imagen. El tratamiento variará según la causa.



Índice:

1. ¿Por qué mi perro anda como si estuviese borracho?
2. Síntomas de alteración en la marcha en los perros
3. Diagnóstico de marcha incoordinada en perros
4. ¿Qué hacer si mi perro anda como si estuviera borracho?

1. ¿Por qué mi perro anda como si estuviese borracho?

Cuando un perro parece anda con descoordinación, pérdida de equilibrio y tambaleo como si estuviese borracho o drogado, **significa que tiene ataxia**, es decir, alteración en la marcha. Este descontrol se produce cuando las vías que informan al cerebro sobre la posición y regulan los movimientos y el equilibrio se alteran por algún motivo, o cuando producen daños en el cerebro.

La ataxia es un signo clínico provocado por diferentes enfermedades o trastornos en los perros. Aunque lo primero que se puede pensar en un perro con esta descoordinación es que presente enfermedad vestibular, medular o cerebelosa, en realidad es un signo común también de otras enfermedades neurológicas y otros trastornos, como algunas enfermedades infecciosas.

El origen de esa forma de andar tambaleante, incordiada y con pérdida del equilibrio puede deberse a las siguientes **causas**:

- **Intoxicaciones**: algunos fármacos (como metronidazol o fármacos para la epilepsia) y productos tóxicos pueden causar este signo neurológico.
- **Moquillo canino**: este virus puede afectar al sistema nervioso causando ataxia.
- **Golpes o caídas** que puedan provocar inflamación e incluso hemorragia cerebral.
- **Síndrome vestibular**: suele acompañarse también de ladeo de la cabeza, movimiento de los ojos de arriba abajo o lateralmente, anorexia y mareos. Si notas que tu perro anda de lado, quizá este sea el motivo.
- **Enfermedades de la médula espinal**: inflamación, traumatismos, tumores, embolias.
- **Otitis** media o interna.

- **Enfermedad vestibular.**
- **Infección vertebral o intervertebral.**
- **Hernia discal.**
- **Discoespondilitis.**
- **Deficiencia de tiamina.**
- **Tumor cerebral.**
- **Síndrome de Wobbler:** problemas a nivel de las vértebras (protrusión, degeneración, estrechamientos), que en ocasiones pueden ser congénitos.
- **Enfermedad cerebelar.**
- **Meningoencefalitis granulomatosa.**
- **Hipocalcemia.**
- **Hipopotasemia.**
- **Hipoglucemia.**
- **Edulcorantes** (xilitol).

En resumen, en los perros podemos encontrar tres tipos principales de ataxia según su origen:

- **Ataxia propioceptiva o sensorial:** ocurre cuando hay daños en la médula espinal y/o vértebras y nervios.
- **Ataxia vestibular:** cuando el daño se produce en el aparato vestibular del oído que gobierna el equilibrio.
- **Ataxia cerebelar:** cuando se ven signos de alteración cerebelar, como los movimientos exagerados (hipermetría) y la incoordinación.
- **Ataxia secundaria:** producida por factores externos (traumas, medicamentos, xilitol, tóxicos) y desequilibrios electrolíticos o nutricionales.

2. Síntomas de alteración en la marcha en los perros

Cuando un perro parece drogado o anda como si estuviese borracho por ataxia, como hemos visto, puede corresponder a un signo secundario de trastornos de diversa índole. Por este motivo, es frecuente que la incoordinación ocurra con síntomas asociados según el proceso originario en cuestión.



Los signos clínicos que puede mostrar un perro con ataxia son los siguientes:

- **Incoordinación motora.**
- **Tambaleos.**
- **Nistagmo.**
- **Hipermetría.**
- **Marcha en círculos.**
- **Paresia.**
- **Temblores.**
- **Convulsiones.**
- **Paresia.**
- **Vómitos.**
- **Náuseas.**
- **Mareos.**
- **Fiebre.**
- **Dolor.**
- **Pinzamiento.**
- **Dificultad respiratoria.**
- **Hemorragias.**
- **Pérdida de equilibrio.**
- **Pérdida de la audición.**
- **Cambios mentales.**
- **Confusión.**
- **Anorexia.**

3. Diagnóstico de marcha incoordinada en perros

Para diagnosticar la causa específica que está provocando que nuestro perro parece que baila debido a la incoordinación, lo primero que se hace en el centro veterinario es indagar en su historia clínica: vacunación, edad, traumatismos recientes, posibilidad de estar en contacto con algún tóxico o medicamento que puede producir ataxia, cuánto lleva con síntomas, si presenta dolor o signos clínicos asociados. De esta manera, se puede establecer una sospecha clínica.

Posteriormente, se debe pasar a realizar un correcto diagnóstico neurológico a fin de intentar **localizar la lesión y las consecuencias**. También se debe **realizar un hemograma** y una **bioquímica sanguínea** completa para indagar sobre posibles alteraciones o déficits electrolíticos. Se puede tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo cuando se sospecha de algún problema o infección en el sistema nervioso.

Para establecer el diagnóstico definitivo se deben realizar pruebas de diagnóstico por imagen, específicamente:

- **Radiografía.**
- **Mielografía** (radiografía de la médula espinal).
- **Resonancia magnética.**
- **Tomografía computarizada (TAC).**



4. ¿Qué hacer si mi perro anda como si estuviera borracho?

- Dadas las múltiples causas que pueden provocar esta alteración de la marcha en los perros, es fundamental **acudir a la clínica veterinaria** para que un profesional realice el diagnóstico y establezca el tratamiento. Un perro que no puede andar de repente debe ser tratado lo antes posible.

El tratamiento variará enormemente según el origen de la incoordinación motora del perro, considerando lo siguiente:

- Cuando es por tóxicos, se debe proceder a su eliminación o a la **aplicación de un antídoto** en caso de que lo tengan.
- Si es por algún fármaco, se debe **pausar la medicación**, reducir la dosis o cambiarlo por otro fármaco.
- Si hay desequilibrios electrolíticos o nutricionales, se deben **suplementar** a fin de llegar a unos niveles adecuados.
- Si hay infecciones, se debe administrar **terapia antibiótica**.
- En caso de tumores, se ha de aplicar el tratamiento adecuado según el caso (quimioterapia, radioterapia, cirugía).
- En ciertos casos se deberá proceder a una **intervención quirúrgica**, como en casos de graves hernias discales compresivas o ciertos tumores.
- En otros casos bastará con cierto **reposo y terapia antiinflamatoria**.
- Ante la presencia de un dolor moderado a intenso, se deben añadir **analgésicos**.
- Si hay vómitos, se pueden utilizar **antieméticos**.
- Si es por moquillo canino, se debe aplicar el tratamiento sintomático específico.
- En algunos casos, y en especial después de las cirugías, puede ser conveniente que el perro haga sesiones de **fisioterapia**.



Por todo lo que hemos abordado, las causas de la pérdida de equilibrio en perros son muy variadas, por lo que ante la sospecha de que tu perro puede estar desarrollando ataxia, debes acudir con urgencia a un centro veterinario para que sea diagnosticada su causa y tratada lo antes posible.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía

- Cancela, A. Seoane, L. Espino. (2020). Caso clínico de Neurología. Disponible en: <https://www.clinvetpeqanim.com/index.php?pag=articulo&art=157>
- J. Cerón, M.J. Fernández, C. García, M. Hervera, S. M. Angulo, D. Pérez, C. Pérez, G. Santamarina. (2016). Manual clínico de medicina interna en pequeños animales I. ESVPS, Ed. SM Publishing Ltd. Sheffield, UK.
- J. López. La ataxia, causante de la descoordinación física en los perros. Disponible en: <https://www.animalshealth.es/mascotas/la-ataxia-causante-de-la-descoordinacion-fisica-en-los-perros>

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Laura García Ortiz, Veterinaria especializada en medicina felina.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*