

15 SIGNOS DE DOLOR EN CONEJOS

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA



Los conejos pueden ser unos estupendos animales de compañía, pero, no son perros ni gatos, por lo que van a necesitar unos **cuidados especializados**. Así, si queremos cuidar de alguno de ellos debemos buscar un veterinario con experiencia en estos animales que, además de encargarse de revisar su salud, nos aconseje sobre cuáles son los mejores cuidados y la alimentación más adecuada.



Índice:

1. Signos generales de dolor en conejos
2. La valoración del dolor en conejos
3. ¿Cuándo administrar analgesia a un conejo?

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA

1. Signos generales de dolor en conejos

El dolor en los conejos **puede pasar desapercibido** en los casos en los que este sea más leve. Aun así, podemos señalar 15 signos de dolor en los conejos, a los que debemos estar atentos ya que, de identificar alguno, tenemos que procurarle asistencia veterinaria. Son los siguientes:

- **Reducción de la actividad:** notaremos que el conejo permanece inmóvil y, cuando se desplaza, lo hará lentamente, en ocasiones cojeando.
- Deshidratación: que podremos apreciar porque la piel pierde elasticidad, el pelo no tiene brillo y los ojos parecen hundidos.
- Letargo y apatía.
- Falta de higiene: porque el conejo deja de acicalarse, con lo que el pelaje se ve descuidado.
- **Cambios en la alimentación:** el conejo come y bebe menos, tarda más tiempo en alimentarse y podemos ver que le cae comida de la boca.
- Problemas oculares: uno o los dos ojos presentan secreciones, están cerrados, estrábicos o cambian de color.
- Posturas extrañas: el conejo puede contraer el abdomen, encorvar el lomo o mantener la cabeza apoyada contra la pared.
- Autoprotección: quiere decir que el conejo evita que se le manipule la zona que siente dolorida. Se esconde o puede mostrarse agresivo de manera repentina.
- Pérdida de interés por lo que sucede en su entorno.
- **Rechinar de dientes o vocalizaciones:** generalmente cuando se le manipula, se mueve, orina o defeca.
- Dificultades respiratorias.
- Trastornos del patrón de sueño o problemas para descansar.

- Expresión facial modificada: esto es, pupilas dilatadas, ausencia de reflejo palpebral, etc.
- Hipersalivación.
- **Aislamiento del grupo:** en el caso de conejos que viven en comunidad, podemos observar que el animal rehúye el contacto con sus iguales.



2. La valoración del dolor en conejos

De los 15 signos de dolor en conejos que hemos resaltado, algunos se van a corresponder con un dolor de leve a moderado, mientras que otros indicarán un dolor intenso o crónico. Tener esto en cuenta es importante para saber si la **atención veterinaria** debe ser inmediata o con qué cuidado debemos manejar a nuestro conejo.

Podemos distinguir los signos de dolor de la siguiente manera:

- **Dolor leve a moderado:** incluiría secreciones oculares, protrusión de la membrana nictitante, fotofobia, estreñimiento o diarrea, depresión, cuerpo apoyado contra una pared, reducción en la ingesta de agua y comida, desinterés, agresividad o vocalizaciones y rechinar de dientes cuando lo manipulamos.

- **Dolor intenso o crónico:** también se produce rechinar de dientes, letargo, deshidratación, adelgazamiento, heces pegadas alrededor de la zona anal, pérdida de masa muscular que puede notarse en las patas traseras, que no tendrán apenas carne, falta de respuesta a estímulos o producción escasa de heces.

3. ¿Cuándo administrar analgesia a un conejo?

Una vez explicados los 15 signos de dolor en conejos a los que debemos prestar atención, veremos ahora en qué casos será necesario administrar **analgesia**, esto es, cualquier fármaco, siempre **prescrito por un veterinario**, para mitigar el dolor que puedan estar causando las distintas [enfermedades de los conejos](#). Pero, además de tratar las molestias, es fundamental buscar la causa que las origina, que es la que debe ser curada para hacer desaparecer el dolor. Los 6 signos clínicos para los que se recomienda analgesia son los siguientes:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| ▪ Ansiedad | ▪ Rechinar de dientes |
| ▪ Inactividad | ▪ Inmovilidad |
| ▪ Inquietud | ▪ Anorexia (de agua y/o comida) |
| ▪ Chillidos o quejidos | ▪ Adelgazamiento |

Como hemos dicho, detectar cualquier signo de sufrimiento en nuestro conejo es **motivo de consulta veterinaria**, siempre con un profesional de experiencia contrastada en el trato con estos animales. Es básico llegar a un diagnóstico para descubrir y tratar la causa primaria del dolor, a la vez que, cuando este es considerable, administramos una analgesia adecuada, pautada en cualquier caso por el veterinario.





Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*