



## ¿LOS PERROS PUEDEN TOMAR PARACETAMOL?

PREVENCIÓN  
DE  
ANIMALES  
DE  
COMPAÑÍA



Algunos cuidadores tienen la mala costumbre de acudir a su propio botiquín cada vez que su perro presenta alguna sintomatología que se les asemeja a una dolencia humana, como puede ser un catarro o unos vómitos. Así, median a sus perros con fármacos comunes de uso humano, como pueden ser el ibuprofeno, el paracetamol o la aspirina, sin ser conscientes de que están poniendo **en peligro a sus perros**.

## Índice:

1. Mediar a los perros
2. El paracetamol
3. La intoxicación en perros por paracetamol
4. Precauciones con los medicamentos

### 1. Mediar a los perros

Aunque no debiera hacer falta decirlo, **tan solo los profesionales de la veterinaria pueden prescribir medicamentos para los animales de compañía**. No es correcto suponer que lo que funciona en humanos va a hacerlo también en perros.

Es cierto que hay fármacos cuyo principio activo sirve tanto a humanos como a perros, pero siempre, insistimos, será el veterinario quien nos los recete. Incluso fármacos de uso tan común y aparentemente tan inofensivos como lo puede ser el paracetamol, tienen **efectos diferentes según la especie**, ya que se van a metabolizar y eliminar, o no, de manera distinta.

Además, incluso aunque pudiésemos compartir determinados fármacos con nuestros perros, **la dosis** no tiene por qué ser la misma, precisamente por lo que hemos explicado de que es diferente su metabolización. A la pregunta de si los perros pueden tomar paracetamol, la respuesta es **sí, pero siempre bajo estricto control veterinario**, como veremos en el siguiente apartado.





## 2. El paracetamol

El paracetamol es un fármaco muy habitual en los botiquines de todos los hogares. Se puede comprar sin receta médica, no suele tener efectos secundarios, se utiliza como **analgésico** para aliviar el dolor leve o moderado y como **antipirético** para bajar la fiebre.

Quizás esta facilidad de adquisición y uso nos hace olvidar que se trata de un fármaco y, como tal, presentará una serie de efectos secundarios que, en los perros, van a ser más graves que en los humanos. Además, tal y como hemos comentado, no se metaboliza igual en todas las especies, y en el perro **puede dañar el hígado**, provocando el cuadro clínico que veremos en el siguiente apartado.

Entonces, ¿los perros pueden tomar paracetamol? Sí, pero nunca sin consultarlo con nuestro veterinario, ya que la dosis y el tiempo de administración deben estar pautados por él. De todas formas, en la actualidad contamos con alternativas con mejores resultados en perros y menos riesgos para su salud.

## 3. La intoxicación en perros por paracetamol

Por lo tanto, hay que insistir, el veterinario será el único profesional responsable de prescribir la medicación de nuestro perro. Como hemos dicho, solo él va a decidir si nuestros perros pueden tomar paracetamol. Si medicamos a nuestro perro con paracetamol por nuestra cuenta corremos **el riesgo de intoxicarlo**, lo que podría tener incluso consecuencias fatales. Los síntomas que pueden observarse en un perro intoxicado por paracetamol son los siguientes:

- Vómitos
- Debilidad
- Dolor abdominal
- Salivación
- Anorexia
- Depresión
- Dificultad respiratoria

Si observamos estos síntomas y le hemos dado paracetamol a nuestro perro o pensamos que puede haberlo ingerido accidentalmente, debemos acudir al veterinario, informándole de lo que se ha tomado. El mayor problema del paracetamol en perros es el daño al hígado. También se puede producir **hemólisis**, proceso que consiste en la rotura acelerada de los glóbulos rojos. La bilis y la hemoglobina que se originan de esta rotura se acumulan en el

organismo, provocando un color amarillento en las mucosas (**ictericia**) y la excreción de una orina marrón por su contenido en hemoglobina.

Dependiendo de las circunstancias el veterinario decidirá el tratamiento más adecuado, que puede consistir en [provocar el vómito](#), suministrar fluidoterapia o incluso realizar una transfusión de sangre. En los casos más graves el perro puede fallecer. Esto debe hacernos reflexionar sobre la importancia de no medicar jamás a nuestro perro por nuestra cuenta.

PREVENCIÓN  
DE  
ANIMALES  
DE  
COMPAÑÍA



#### 4. Precauciones con los medicamentos

Hemos visto que los perros pueden tomar paracetamol solo bajo control veterinario, así que, para evitar accidentes que pueden tener consecuencias fatales, es conveniente observar las siguientes precauciones:

- No medicar nunca a nuestro perro si no es bajo prescripción veterinaria.
- Guardar siempre los medicamentos lejos del alcance de nuestros perros.
- Cuando tengamos que medicarlos, debemos hacerlo siempre siguiendo escrupulosamente las indicaciones de nuestro veterinario, en cuanto a dosis y duración del tratamiento.



- Si sospechamos que nuestro perro ha podido ingerir una cantidad elevada de paracetamol o se la hemos dado nosotros, debemos trasladarlo al veterinario inmediatamente.

*Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.*

PREVENCIÓN  
DE  
ANIMALES  
DE  
COMPAÑÍA

**FUENTE:** [www.expertoanimal.com](http://www.expertoanimal.com)

**AUTOR:** María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*