

COCCIDIOSIS EN GATOS - SINTOMAS Y TRATAMIENTO



Sin duda alguna, una de las consultas más frecuentes en la clínica de pequeños animales está asociada a **problemas digestivos**. La dieta, la frecuencia con la que el animal defeca, la consistencia de las heces y muchas otras, son dudas que constantemente tienen los propietarios a la hora de valorar la salud de sus mascotas.

Los problemas digestivos en gatos pueden estar asociados a muchas causas y se requiere de rapidez por parte del propietario para que su mascota reciba atención médica lo antes posible y, así, aumentar las posibilidades de que vuelva a la normalidad en un tiempo prudencial.

Índice:

1. ¿Qué es la coccidiosis en gatos?
2. Síntomas de la coccidiosis en gatos
3. Diagnóstico de la coccidiosis en gatos
4. Tratamiento de la coccidiosis felina

1. ¿Qué es la coccidiosis en gatos?:

La coccidiosis es una **enfermedad parasitaria**, causada por microorganismos que suelen ubicarse en el intestino delgado. Esta infección causa una diarrea severa, que puede ser sanguinolenta, y es muy peligrosa en animales jóvenes. Aun cuando se ha descrito que las coccidias no son demasiado patógenas en felinos, es una enfermedad bastante riesgosa en animales menores a seis meses. Los animales adultos pueden contener cierta cantidad de coccidias en su intestino y no padecer síntoma alguno.

a) ¿La coccidiosis se contagia a humanos?

Las coccidias que más parasitan al gato pertenecen al género *Isospora*, y **no son capaces de infectar a seres humanos**. Por contrapartida, una coccidia muy importante que puede parasitar humanos es el *Toxoplasma*, causante de la *toxoplasmosis en gatos*, una de las enfermedades más estudiadas en humanos en los últimos tiempos.

b) ¿Cómo se contagia la coccidiosis felina?:

Las formas infectivas de las coccidias se encuentran **en las heces**, por ello, son la principal fuente de contagio para otros animales susceptibles. Se ha reportado que estas formas infectivas pueden ser ingeridas por ratones, que, al ser cazados por gatos, terminan infectándolo de manera indirecta.

El sistema inmunológico de cada animal juega un papel fundamental a la hora de que la enfermedad pueda o no presentarse. Es importante la correcta **limpieza de la caja de arena** o el lugar donde defecan tus mascotas para evitar que otro animal pueda salir perjudicado en caso de que haya formas infectivas de coccidias en sus deposiciones.



2. Síntomas de la coccidiosis en gatos:

Los síntomas son bastante comunes si hablamos de un cuadro digestivo. Es normal que acuda el propietario a consulta porque su mascota no se está comportando igual y que está eligiendo los alimentos. Lo primero que se puede notar en cualquier animal, es **falta de apetito y apatía**, pero conforme la parasitosis avanza y se hace presente la reproducción de los microorganismos, podemos apreciar:

- **Letargia:** en todas las enfermedades donde el animal ha perdido sangre, podrá ser evidente un síntoma de "desgano". Este signo se nota muchísimo si en condiciones normales el animal es vivaz, y suele ser motivo de preocupación inmediata para el propietario.
- **Anorexia:** es normal que en los cuadros digestivos el animal pierda peso en poco tiempo. En cuestión de días, se puede notar una gran diferencia y se debe acudir al veterinario de inmediato.
- **Diarrea** (a veces sanguinolenta): por procesos de inmunidad parasitaria, se producirá una diarrea. En algunos casos, la reproducción de los parásitos rompe la célula intestinal y se puede apreciar sangre en las heces.
- **Dolor abdominal:** uno de los signos más preocupantes en gatos es el dolor abdominal, que a primera instancia se asocia con enfermedades mortales. Es normal que por el proceso que está ocurriendo a nivel intestinal, el paciente presente fuertes dolores abdominales.

- **Fiebre:** podremos apreciar la temperatura más elevada de lo normal, sobretodo si una infección secundaria se ha instaurado en el intestino del felino.
- **Vómitos:** si bien el daño es a nivel intestinal, el dolor y las náuseas terminan causando vómitos recurrentes en nuestra mascota.
- **Deshidratación:** la diarrea, los vómitos y la disminución en la ingesta de agua y alimentos, terminan provocando una deshidratación importante en el paciente...
- **Tenesmo:** se trata de contracciones fuertes y dolorosas de un órgano (del recto, en este caso), acompañadas generalmente del vaciado incompleto de éste.

Si tu gato presenta alguno de estos síntomas, no lo dudes y llévalo al veterinario para poder tratar cuanto antes la parasitosis.



3. Diagnóstico de la coccidiosis en gatos:

La enfermedad termina diagnosticándose cuando el practicante veterinario relaciona los signos clínicos con los resultados de laboratorio. Se necesitará **un examen de heces y uno de sangre** para llegar al diagnóstico definitivo.

El médico veterinario debe poseer cierta destreza a la hora de identificar huevos de coccidias, ya que, aunque son bastante peculiares y es realmente difícil identificar la especie, sobre todo en los primeros estadios. Esto tiene cierta importancia clínica, debido a que **no todas las coccidias son patógenas en gatos**, y eso tergiversa el diagnóstico definitivo a la hora de relacionar la presencia de huevos no patógenos con los signos clínicos.

Se debe tener en cuenta que la presencia de coccidias en las heces no significa que de manera obligatoria el animal padezca de coccidiosis, ya que los animales adultos pueden vivir tranquilamente con cierta carga parasitaria sin presentar síntomas.



4. Tratamiento de la coccidiosis felina:

El tratamiento va a depender de las características del paciente y la evolución de la enfermedad. Primero que todo, se debe instaurar un **tratamiento sintomatológico** para revertir los daños que la parasitosis ha causado. Generalmente se utilizan:

- **Fluidos:** para restablecer las pérdidas de agua y electrolitos.
- **Fármacos:** aquellos que ayuden al paciente con el dolor abdominal.
- **Inhibidores del vómito:** solo si la situación lo amerita.

Esta acción es la primordial, ya que de esto podría depender la vida del animal. Después de esto se debe realizar un tratamiento etiológico, que se refiere a combatir directamente al agente responsable de la enfermedad. Las coccidias son susceptibles a **ciertos antibióticos** pertenecientes a la familia de las sulfonamidas, y si se realizó bien el tratamiento sintomatológico, generalmente el pronóstico suele ser positivo. No debemos olvidar que cada médico tiene su criterio y que los tratamientos son elegidos por los veterinarios. Bajo ninguna circunstancia, el propietario debe medicar a su mascota sin supervisión del médico de su mascota.





- ★ *Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.*

Bibliografía:

- Cordero del Campillo, M., Rojo Vázquez, F. A. (1999). Parasitología veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana.
- Quiroz, R. H. (1984). Parasitología y enfermedades parasitarias de animales domésticos. Editorial Limusa.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Manuel F. Faneite P., Veterinario

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar*